

SKIEROWANIE DO PRACOWNI RTG - UROGRAFIA



SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO NR 1
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
rejestracja tel. 52 585 4688, 52 858 4685
fax. 52 585 4050

.....
dane jednostki kierującej

data zlecenia	data wpływu skierowania	wyznaczony termin	pieczętka i podpis rejestratorki

WYPEŁNIA LEKARZ KIERUJĄCY

DANE PACJENTA

imię i nazwisko: PESEL:
adres: data urodzenia:
telefon: ciężar ciała: wiek: płeć:
ICD-10:
rozpoznanie
kliniczne:

BADANIE

co badanie
ma wyjaśnić?
poprzednio wykonane badania: badania dołączone do skierowania:

WYPEŁNIA PERSONEL ZAKŁADU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

BADANIE

data badania: pieczętka i podpis elektroradiologa: pieczętka i podpis lekarza opisującego:

PODANIE ŚRODKA KONTRASTUJĄCEGO

pieczętka i podpis lekarza zlecającego: pieczętka i podpis pielęgniarki:
rodzaj środka kontrastującego: objętość (ml):
uwagi:

Czy u pacjenta występują (wypełnia lekarz kierujący wspólnie z pacjentem):

Umiarkowana lub ciężka (wymagająca leczenia) reakcja na jodowy środek kontrastowy w wywiadzie ¹	tak	☐	nie	☐
Uczulenie wymagające leczenia w wywiadzie ¹	tak	☐	nie	☐
Astma oskrzelowa ¹	tak	☐	nie	☐
Jawna nadczynność tarczycy ²	tak	☐	nie	☐
Niewydolność serca NYHA > II	tak	☐	nie	☐
Cukrzyca	tak	☐	nie	☐
Choroby nerek w wywiadzie, białkomocz	tak	☐	nie	☐
Szpiczak mnogi	tak	☐	nie	☐
Nadciśnienie tętnicze	tak	☐	nie	☐
Dna moczanowa	tak	☐	nie	☐
Przyjmowanie metforminy ³	tak	☐	nie	☐
Leki (proszę podkreślić przyjmowany lek): leki przeciwbólowe (NPLZ) ³ , aspiryna ³ , aminoglikozydy ³ , leki moczopędne, tak	tak	☐	nie	☐
inhibitory enzymu konwertującego, antagoniści receptora angiotensyny II, interleukina 2				

¹ Zalecana premedykacja: 30 mg prednizolonu (lub 32 mg metyloprednizolonu) p.o. na 12 i 2 godziny przed podaniem środka kontrastującego

² Konieczna konsultacja endokrynologiczna

³ Zaznaczone leki nefrotoksyczne należy odstawić na 48 godz. przed badaniem i włączyć po 48 godzinach po badaniu pod warunkiem wykluczenia nefropatii pokontrastowej. W przypadku przyjmowania metforminy i eGFR ≥ 45 ml/min/1,73 m² nie należy odstawiać metforminy. W przypadku eGFR < 30 ml/min/1,73 m² lub przyjmowania metforminy i eGFR < 45 ml/min/1,73 m² badania z użyciem środka kontrastującego wykonywane są jedynie w trybie hospitalizacji.

Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe według mojej najlepszej wiedzy. Przeczytałem(-am) i zrozumiałem(-am) całą zawartość tego formularza i miałem(-am) możliwość zadania pytań odnośnie zawartych w nim informacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) przez lekarza kierującego o możliwości wystąpienia działań niepożądanych i będąc tego świadomy(-a) wyrażam zgodę na wykonanie ww. badania.

podpis pacjenta

.....
(w przypadku osób niepełnoletnich podpis opiekuna prawnego lub pacjenta i opiekuna)

Aktualne stężenie

kreatyniny w surowicy eGFR (wg MDRD) ml/min/1,73 m² data badania

pieczętka i podpis lekarza kierującego

Informacja dla pacjenta

Urografia jest badaniem z użyciem potencjalnie szkodliwego promieniowania jonizującego. U kobiet w ciąży urografia może być wykonywana jedynie w sytuacji ratowania życia. Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne, trwa od 30 minut do 12 godzin i wymaga dożylnego podania środka kontrastującego. Prosimy o dostarczenie wyników poprzednio wykonanych badań obrazowych (USG, RTG, TK, MR, scyntygrafia, PET) w postaci opisu i CD.

W przypadku zaplanowanej urografii z użyciem środka kontrastującego pacjent powinien zgłosić się na czczo, to jest powstrzymać się od jedzenia przez 6 godzin przed badaniem. Dzień przed badaniem pacjent powinien oczyścić jelita z gazu (np. Espumisan 3 razy po 2 kapsułki) i zalegających mas kałowych (doustnie np. Xenna, Forlax, Bisacodyl, herbata z senesem). W dniu badania należy zażyć wszystkie zwykle przyjmowane leki (z wyjątkiem insuliny) popijając niewielką ilością wody niegazowanej. Pacjenci przyjmujący insulinę proszeni są o omówienie postępowania z diabetologiem. W pierwszej dobie po badaniu zaleca się wypicie ok. 2,5 litra wody niegazowanej.

Po podaniu środka kontrastującego może wystąpić uczucie ciepła oraz, w rzadkich przypadkach, inne reakcje uboczne (nudności, wymioty, pokrzywka, skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia). Powikłania występują najczęściej w ciągu 30 minut po podaniu środka kontrastującego, w związku z tym po badaniu pacjent pozostaje przez ten okres w pracowni pod obserwacją. Nie ma konieczności przerywania karmienia piersią po badaniu. U pacjentów z upośledzoną funkcją nerek może wystąpić późne, poważne powikłanie w postaci nefropatii pokontrastowej. Dlatego do badania wymagane jest dostarczenie aktualnego wyniku pomiaru stężenia kreatyniny we krwi. Wynik oznaczania kreatyniny jest ważny przez 3 miesiące.

Wynik badania można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną. Upoważnienie musi być wystawione osobiście przez pacjenta w Rejestracji. Istnieje również możliwość wysłania wyniku drogą pocztową (prosimy o zgłoszenie takiej prośby w Rejestracji).